

販売名:新オキシロンE300

第3類医薬品

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、便秘、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 服用後、生理が予定より早く来たり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能]

- ・末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- ・更年期における次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ・ほてり
- ・月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

- ・次の場合のビタミンEの補給:老年期

[用法・用量]

成人(15歳以上) 1回2カプセル

7歳以上15歳未満 1回1カプセル

7歳未満服用しないでください

1日3回、食後に服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分・分量] 6カプセル中

トコフェロール酢酸エステル(ビタミン E) 300mg

チアミン硝化物(ビタミン B₁) 18mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B₆) 36mg

理研オキシレジン末(にんにく抽出成分) 1,000mg

添加物として、二酸化ケイ素、パレイショデンプン、炭酸Ca、セルロース、無水ケイ酸を含み、カプセル本体はヒプロメロース、酸化チタン、黄色三酸化鉄を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。
5. 本剤は、開封後の保管の状況により、臭いがする場合がありますが、内容成分に変化はございませんのでご安心ください。
6. PTPのアルミ箔が破れ、中身のカプセルが変質しないように、保管及び携帯にご注意ください。

使用のカプセルは、牛、豚などの動物性ではなく、植物性のセルロースカプセルを使用しております。

右図のように、カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で押し取り出しますが、余力が強すぎますと、カプセルが割れる場合がありますので、ツメを立てず指先でやさしく押し出してください。(誤ってそのまま飲み込まないでください)

発売元 日邦薬品工業株式会社 東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 米田薬品工業株式会社 奈良県高市郡高取町市尾986

本品についてのお問い合わせ先

・お買い求めのお店

・日邦薬品工業株式会社 学術情報室

住所: 東京都渋谷区代々木3-46-16

電話: 03-3370-7174 (代表)

受付時間: 9:00~17:00まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話: 0120-149-931