

鎮咳去痰薬

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アンバーせき止め錠

第②類医薬品

「アンバーせき止め錠」は、せき中枢に直接作用するジヒドロコデイン塩酸塩と、アレルギー性のせきに効くクレマスチンフマル酸塩がせきを鎮め、d l-メチルエフェドリン塩酸塩が気管支を広げて呼吸を楽にします。また、L-カルボシステインがたんの排出を促し、不快なたんの症状を効果的に改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）。

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがある。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 過量服用・長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、興奮、けいれん
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

裏面もお読みください。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効 能

せき、たん

● 用法・用量

成人（15歳以上）…………… 1回2錠
12歳以上 15歳未満 …………… 1回1錠
12歳未満 …………… 服用しないでください。

1日3回食後に服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【錠剤の取り出し方】



おしだす
上図のように、錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

● 成分・分量 6錠中

ジヒドロコデインリン酸塩…………… 30mg（せき中枢に作用して、せきを鎮めます）
d l-メチルエフェドリン塩酸塩…………… 75mg（気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきを鎮めます）
L-カルボシステイン…………… 750mg（たんをやわらかくし、吐き出しやすくします）
クレマスチンフマル酸塩…………… 1.34mg（抗ヒスタミン剤。アレルギーによるせきを鎮めます）
（クレマスチンとして1mg）

添加物として、乳糖水和物、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタンを含有します。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

米田薬品工業株式会社
製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

本品について
のお問合せ先 お客様相談室 電話：0120-18-3548
月～金曜日（祝日を除く）10:00～16:00

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

2403A