

* 2023年1月改訂

総合かぜ薬

カゼットエース総合かぜ薬

第②類医薬品

「カゼットエース総合かぜ薬」は、頭痛・発熱を鎮めるアセトアミノフェンや、つらい鼻づまりの症状を抑えるd-クロルフェニラミンマレイン酸塩など、かぜの諸症状を抑える各種成分に加え、かぜをひいた時の発熱などで消耗しやすいビタミンB₁、B₂、ビタミンCを配合した総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。
 3. 服用後、眼鏡等があらわれることがあるので乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
 4. 服用前後は飲酒しないでください。
 5. 長期連用しないでください。

▢ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 高熱や排尿困難の症状のある人。
(7) 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、縁内障の診断を受けた人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

関係部位	症 状
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群*	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。*

裏面もお読みください。

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(筋肉が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空咳、発熱等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、口のかわき、眠気の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

● 成分・分量 9錠中

アセトアミノフェン 900mg (発熱、頭痛、のどの痛みなど熱と痛みを鎮めます)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg (くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状をおさえます)
チベピジンヒベンズ酸塩 75mg (せきを鎮めるとともに、たんの排出を促します。)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg (気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきを鎮めます)
グアイフェネシン 200mg (たんを出しやすくします)
無水カフェイン 75mg (頭痛を鎮めます)
チアミン硝化物 10mg (ビタミンB₁、かぜの時消耗したビタミンを補給します)
リボフラビン 12mg (ビタミンB₂、かぜの時消耗したビタミンを補給します)
アスコルビン酸 500mg (ビタミンC、かぜの時消耗したビタミンを補給します)
添加物として、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、黄色5号を含有します。

● 用法・用量

成人(15歳以上) 1回 3錠 11歳以上 15歳未満 1回 2錠
5歳以上 11歳未満 1回 1錠 5歳未満 服用しないでください。
1日 3回食後なるべく30分以内に服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。



糸田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

本品について お客様相談室 TEL 0120-18-3548
のお問合せ先 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

2306C