

## ビタミンB<sub>2</sub> 剤

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

### 〔特 徴〕

# ニッドビタミンBB錠

第3類医薬品

- 本品は、肌あれ・にきび・口内炎の緩和と疲れた時に効果的です。ビタミンB<sub>2</sub>が細胞の新陳代謝を助け、皮膚、粘膜の症状を改善します。
- 本品にはビタミンB<sub>2</sub>の他、皮膚のビタミンと呼ばれるビタミンB<sub>6</sub>、疲れによいビタミンB<sub>1</sub>やパントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミドに加え、ガンマーオリザノールなどの有効成分が協力しあって体全体の働きを円滑にし改善します。



### ⚠ 使用上の注意

#### ■ 相談すること

1. 服用後、皮ふ部に発疹症状、消化器に胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
2. 服用後、下痢症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合、又は1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### ● 効能

次の諸症状の緩和：口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

### ● 用法・用量

成人(15歳以上) ..... 1回1錠 1日2回服用してください。

15歳未満は、服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

### ● 成分・分量 2錠中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB <sub>2</sub> リン酸エステル) .....	38mg	ガンマーオリザノール .....	10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) .....	50mg	チアミン硝酸化物(ビタミンB <sub>1</sub> 硝酸塩).....	20mg
パントテン酸カルシウム .....	20mg	ニコチン酸アミド .....	40mg

添加物として、乳酸Ca水和物、セルロース、カルメロースCa、無水ケイ酸、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、リボフラビン、黄色5号、赤色3号、青色1号、カルナウバロウを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤の使用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤成分のビタミンB<sub>2</sub>が吸収され、その一部が尿中に排出されるためで心配いりません。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(5) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

米田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

本品について  
のお問合せ先

お客様相談室 電話：0120-18-3548  
月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931 2410M

