

# フルスルゴールドEXハイ

第3類医薬品

## 〔特 徴〕

- 本品は、ビタミンB<sub>1</sub>誘導体のフルスルチアミン塩酸塩、ビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンB<sub>12</sub>のビタミン群を主剤とした製剤で、更にニコチン酸アミド及び自律神経をコントロールするガンマーオリザノールが効果的に作用し、目の疲れ、肩こり、腰の痛みなど、ツライ症状に優れた効果をあらわします。
- 補酵素となってエネルギーの産生に作用するパントテン酸カルシウム、体の末端の血流循環を改善するビタミンEを配合しています。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、皮膚部に発疹・発赤、かゆみの症状、消化器部に吐き気・嘔吐、胃部不快感、口腔部に口内炎の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合。(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。
4. 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ●成分・分量 3錠(1日最大服用量)中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体) ..... 109.16mg (フルスルチアミンとして100mg)	ガンマーオリザノール ..... 10mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) ..... 103.58mg (dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) ..... 100mg
添加物として、乳酸カルシウム水和物、カルメロースカルシウム、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸カルシウム、タルク、酸化チタン、リボフラビン、カルナウバロウを含有します。	シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> ) ... 1,500µg
	パントテン酸カルシウム ..... 30mg
	ニコチン酸アミド ..... 60mg

## ●用法・用量

成人(15歳以上) ..... 1日1回2~3錠 1日1回食後に水又はお湯でかまわずに服用してください。  
15歳未満は、服用しないでください。  
〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

## ●効能

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」

次の場合のビタミンB<sub>1</sub>、B<sub>6</sub>、B<sub>12</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

